

第②類医薬品 10g

販売名：キンカンピラック

割れて痛がゆい・かゆくてつらい

指湿疹<sup>なごだ</sup>

PVA  
(抗炎症成分)  
配合

効能・効果

湿疹、かぶれ、かゆみ、皮膚炎、じんましん、あせも、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

成分・分量 1g中

プレドニゾン吉草酸 エステル酢酸エステル(PVA)	1.5mg
クロタミトン	50mg
アラントイン	2mg
リドカイン	10mg
イソプロピルメチルフェノール	1mg

添加物としてポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、グリセリン、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、セタノール、プロピレングリコール、メチルフェニルポリシロキサン、スクワラン、パラベン、エデト酸Na、pH調節剤を含有します。

【消費者相談窓口】

株式会社金冠堂 お客様相談室 発売元

TEL 03-3421-6171(代表) 株式会社金冠堂

受付時間 9:00~16:00

月~金(祝日を除く)

〒154-0023

東京都世田谷区若林1丁目18番10号

注意

1. 次の部位には使用しないでください。  
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部  
(2)すり傷、切り傷  
(3)目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3)薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(4)患部が広範囲の人  
(5)湿潤やただれのひどい人
4. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください。
5. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
7. 開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

セントラル製薬株式会社

大阪市中央区北浜東1番29号

